



No son pacientes reales.

Con el Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer

Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo
\$0 por PANZYGA*

- Los pacientes deben tener seguro comercial para ser elegibles
- Los pacientes no son elegibles si están inscritos en un programa de seguro financiado por el estado o el gobierno federal

*Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar tan solo \$0 por PANZYGA y pueden recibir un beneficio máximo de \$12,500 por año o el costo del copago del paciente en un período de 12 meses (lo que sea menor) por las reclamaciones recibidas por el programa. Se aplican términos y condiciones/requisitos de elegibilidad. Consulte los términos y condiciones completos en la página 3 o visite PanzygaCoPay.com.

Consulte los términos y condiciones y otros detalles en las siguientes páginas.

panzyga[®]
 Inmunoglobulina
 intravenosa (humana), ifas
 10 % preparación líquida

{se pronuncia: *pan-zee-guh*}

INDICACIONES Y USO

PANZYGA (inmunoglobulina intravenosa [humana], ifas) está indicado para el tratamiento de la inmunodeficiencia humoral primaria (IP) en pacientes de 2 años de edad y más, trombocitopenia inmunitaria crónica (TPIc) en adultos y polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) en adultos.

PANZYGA es un medicamento líquido para infusión que contiene inmunoglobulina G (IgG), que son proteínas que ayudan a combatir las infecciones. Está hecho de plasma humano donado por personas sanas y contiene anticuerpos. Para los pacientes con IP, PANZYGA ayuda a reemplazar los anticuerpos faltantes en el cuerpo. Para los pacientes con TPIc, PANZYGA ayuda al cuerpo a mantener más plaquetas (los glóbulos sanguíneos que ayudan a la coagulación de la sangre) para controlar o prevenir sangrados. Para los pacientes con PDIC, PANZYGA puede ayudar a mejorar la movilidad y la fuerza de las manos.

PANZYGA se administra en una vena (por vía intravenosa) en un hospital, centro de infusión, consultorio médico o en el hogar por un proveedor de atención médica (healthcare provider, HCP) capacitado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

ADVERTENCIA: TROMBOSIS, INSUFICIENCIA RENAL e INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

Consulte la información de prescripción completa para conocer el RECUADRO DE ADVERTENCIA completo.

- Se puede presentar trombosis con productos de inmunoglobulina intravenosa (IGIV), incluido PANZYGA. Los factores de riesgo pueden incluir: edad avanzada, inmovilización prolongada, afecciones hipercoagulables, antecedentes de trombosis venosa o arterial, uso de estrógenos, catéteres vasculares permanentes, hiperviscosidad y factores de riesgo cardiovascular.
- Se puede presentar insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda, nefropatía osmótica y muerte con la administración de productos de IGIV en pacientes predispuestos. La insuficiencia renal e insuficiencia renal aguda se presentan con mayor frecuencia en pacientes que reciben productos de IGIV que contienen sacarosa. PANZYGA no contiene sacarosa.
- Para pacientes con riesgo de trombosis, insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda, administre PANZYGA a la velocidad de infusión mínima posible. Asegúrese de que los pacientes estén hidratados adecuadamente antes de la administración. Monitorear para detectar signos y síntomas de trombosis y evaluar la viscosidad de la sangre en pacientes con riesgo de hiperviscosidad.

Haga clic [aquí](#) para ver la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA completo.



El Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer está disponible a través de farmacias de infusión especializadas participantes

panzyga®
Inmunoglobulina
intravenosa (humana), ifas
10 % preparación líquida



¿Qué es PANZYGA?

PANZYGA es un medicamento líquido para infusión que contiene inmunoglobulina G (IgG), que es una proteína que ayuda a combatir las infecciones. PANZYGA se usa para tratar a pacientes de 2 años de edad y más con inmunodeficiencia primaria (IP), adultos con trombocitopenia inmunitaria crónica (TPIc) y adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC).



¿Qué proporciona el Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer?

Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar tan solo \$0 por PANZYGA y pueden recibir un beneficio máximo de \$12,500 por año o el costo del copago del paciente en un período de 12 meses (lo que sea menor) por las reclamaciones recibidas por el programa. Se aplican términos y condiciones/requisitos de elegibilidad. Consulte los términos y condiciones completos en la página siguiente.



¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para el Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer?

- Los pacientes deben tener 2 años o más para ser elegibles
- Los pacientes deben tener seguro comercial para ser elegibles
- Los pacientes no son elegibles si están inscritos en un programa de seguro financiado por el estado o el gobierno federal (consulte los términos y condiciones en la página siguiente).



¿Qué farmacias de infusión especializadas participan en el Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer?

Todas las farmacias de infusión especializadas pueden participar en el Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer.

¿ESTÁ LISTO PARA INSCRIBIRSE? Comuníquese con su farmacia de infusión especializada hoy mismo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No use PANZYGA si:

- Ha tenido una reacción alérgica severa a la inmunoglobulina u otros hemoderivados.
- Tiene una afección denominada deficiencia selectiva (o grave) de inmunoglobulina A (IgA), con anticuerpos contra la IgA y antecedentes de hipersensibilidad.

¿Qué debo saber antes de tomar PANZYGA?

- PANZYGA puede hacer que las vacunas (como las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola o la varicela) funcionen de manera menos eficaz para usted. Antes de recibir cualquier vacuna, informe a su proveedor de atención médica que toma PANZYGA.
- Se puede presentar disminución de la función renal e insuficiencia renal.
- Se puede presentar dolor de cabeza severo, somnolencia, fiebre, movimientos oculares dolorosos o náuseas y vómitos.
- Se puede presentar presión arterial elevada especialmente en pacientes con antecedentes de hipertensión (presión arterial alta).
- Si es de edad avanzada y tiene problemas cardíacos o renales, hable con su proveedor de atención médica antes de iniciar el tratamiento con PANZYGA.
- PANZYGA se fabrica a partir de sangre humana y, por lo tanto, puede tener un riesgo de transmitir agentes infecciosos, incluidos virus y, teóricamente, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) y el agente de la ECJ. El proceso de producción y fabricación reduce este riesgo, pero el riesgo no puede eliminarse.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Al usar esta tarjeta de copago, usted reconoce que actualmente cumple con los criterios de elegibilidad y que cumplirá con los términos y condiciones descritos a continuación:

Los pacientes no son elegibles para usar esta tarjeta si están inscritos en un programa de seguro financiado por el estado o el gobierno federal, entre los que se incluyen Medicare, Medicaid, TRICARE, atención médica de Asuntos de Veteranos, un programa estatal de asistencia con medicamentos recetados o el Plan de Seguro Médico del Gobierno disponible en Puerto Rico (antes conocido como "La Reforma de Salud"). El paciente debe tener seguro privado. La oferta no es válida para los pacientes que pagan en efectivo. El valor de esta tarjeta de copago se limita a un máximo de \$12,500 por año calendario o al costo del copago para pacientes en un período de 12 meses, lo que sea menor. Esta tarjeta de copago no es válida cuando el costo total de su medicamento recetado es elegible para ser reembolsado por su plan de seguro privado u otros programas privados de beneficios de salud o farmacia. Debe deducir el valor de esta tarjeta de copago de cualquier solicitud de reembolso presentada a su plan de seguro privado, ya sea directamente por usted o en su nombre. Usted es responsable de informar el uso de la tarjeta de copago a cualquier aseguradora privada, plan de salud u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la receta surtida usando la tarjeta de copago, según sea necesario. No debe usar la tarjeta de copago si su aseguradora o plan de salud prohíbe el uso de tarjetas de copago del fabricante. El paciente debe tener 2 años o más para ser elegible para el beneficio de copago. La tarjeta de copago no puede combinarse con ningún otro ahorro, prueba gratuita u oferta similar para la receta especificada. **La tarjeta de copago se aceptará solo en las farmacias participantes. Si su farmacia no participa, es posible que pueda presentar una solicitud de reembolso en relación con esta oferta. Esta tarjeta de copago no es un seguro médico.** Oferta válida solo en los EE. UU. y Puerto Rico. La tarjeta de copago se limita a 1 por persona durante este período de oferta y es intransferible. No se puede canjear una tarjeta de copago más de una vez durante 13 días por paciente. No es necesaria ninguna otra compra. Sin cargo por afiliación. Los datos relacionados con el canje de la tarjeta de copago pueden recopilarse, analizarse y compartirse con Pfizer para investigación de mercado y otros fines relacionados con la evaluación de los programas de Pfizer. Los datos compartidos con Pfizer serán agregados y anónimos; se combinarán con los datos relacionados con otros canjes de tarjetas de copago y no lo identificarán. Pfizer se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin previo aviso. La oferta vence el 31/12/2023. Para obtener más información, llame al 1-866-642-7606, visite <https://panzyga.pfizerpro.com/support/co-pay-program-for-patients> o escriba a: Panzyga Co-Pay Program, P.O. Box 6875, Bridgewater, NJ 08807.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

PANZYGA puede causar efectos secundarios serios. Si se produce alguno de los siguientes problemas después de iniciar PANZYGA, interrumpa la infusión de inmediato y comuníquese con su HCP o llame a los servicios de urgencias:

- Ronchas, hinchazón de la boca o la garganta, comezón, dificultad para respirar, sibilancia, desmayos o mareos. Estos podrían ser signos de una reacción alérgica seria.
- Dolor de cabeza intenso con náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, fiebre, somnolencia, movimientos oculares dolorosos y sensibilidad a la luz. Estos podrían ser signos de irritación e hinchazón del revestimiento que rodea el cerebro.
- Reducción de la micción, aumento repentino de peso o hinchazón de las piernas. Estos podrían ser signos de un problema renal (disminución de la función renal o insuficiencia renal).
- Dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento o un bulto en las piernas o los brazos. Estos podrían ser signos de un coágulo de sangre, que podría ocurrir en el corazón, el cerebro, los pulmones o en cualquier otra parte del cuerpo.
- Orina café o roja, hinchazón, fatiga, frecuencia cardíaca rápida, dificultad para respirar o piel u ojos amarillos. Estos podrían ser signos de un problema hepático o sanguíneo.
- Dolor en el pecho o dificultad para respirar, o labios o extremidades azules. Estos podrían ser signos de problemas cardíacos o pulmonares serios.
- Fiebre superior a 37.7 °C (100 °F). Esto podría ser un signo de una infección.
- Dolor de cabeza, fatiga o confusión, problemas de visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, latidos irregulares o palpitaciones en el pecho, el cuello o los oídos. Estos podrían ser signos de presión arterial alta.

Pregunte a su HCP si debe tener medicamentos de rescate disponibles, como antihistamínicos o epinefrina.



mypanzyga[™] es un programa en línea para pacientes y sus cuidadores.

Inscríbese en PanzygaInfo.com para que le envíen los recursos directamente a su bandeja de entrada, incluida la información sobre el Programa de copagos de PANZYGA de Pfizer*.

*Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar tan solo \$0 por PANZYGA y pueden recibir un beneficio máximo de \$12,500 por año o el costo del copago del paciente en un período de 12 meses (lo que sea menor) por las reclamaciones recibidas por el programa. Se aplican términos y condiciones/requisitos de elegibilidad. Consulte los términos y condiciones en PanzygaCoPay.com.

No es un paciente real.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles o razonablemente probables de PANZYGA?

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con PANZYGA son los siguientes:

- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Fiebre
- Aumento de la presión arterial
- Dermatitis
- Fatiga
- Dolor abdominal
- Mareos
- Anemia

Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Hable con su HCP sobre cualquier efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Infórmele a su HCP si está embarazada o planea quedar embarazada o está amamantando.

Los pacientes siempre deben pedir asesoramiento a sus médicos sobre los eventos adversos.

Puede informar un evento adverso relacionado con los productos de Pfizer al llamar al 1-800-438-1985 (solo para EE. UU.). Si lo prefiere, puede comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. La FDA ha establecido un servicio de notificación conocido como MedWatch, donde los profesionales de atención médica y los consumidores pueden informar problemas que sospechan que pueden estar relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos que recetan, despachan o usan. Visite www.fda.gov/MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.

PANZYGA[®] es una marca comercial registrada de Octapharma AG.

Haga clic [aquí](#) para ver la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA completo.



Manufactured by Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H.
Distributed by Pfizer Labs, Division of Pfizer Inc.